

Vážení a milí pediatři,

předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá z 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1. Původcem vulgárního impetiga je nejčastěji:
 - a) Streptococcus pyogenes
 - b) Staphylococcus aureus
 - c) smíšená infekce Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus
 - d) Staphylococcus epidermidis
2. Který původce akutní otitidy je nejnebezpečnější, kdy a proč?
 - a) Streptococcus pneumoniae – dítě do 5 let věku má oslabený imunitní systém
 - b) Streptococcus pneumoniae – virové infekty do 2 let věku oslabují organismus dítěte, takže se nedokáže bránit pneumokokové infekci, přestože má proti pneumokokovi protilátky
 - c) Streptococcus pneumoniae – dítě do 2 let věku nedokáže vytvářet protilátky proti jeho kapsulárnímu antigenu
 - d) Streptococcus pneumoniae – očkování dítěte v raném věku způsobuje ztrátu imunity a tím je dítě vystaveno agresivním pneumokokovým infekcím
3. H-F-M syndrom je nejčastěji vyvolán:
 - a) pyogenním streptokokem
 - b) 6. herpetickým virem
 - c) virem coxsackie A16
 - d) lidským papilomavirem B19
4. Dítě trpící zácpou:
 - a) není třeba vyšetřovat – můžeme ihned zahájit léčebná opatření
 - b) musí být vždy vyšetřeno dětským gastroenterologem
 - c) může léčit praktický pediatr (po zhodnocení anamnestických údajů a fyzikálním vyšetření)
 - d) není vhodné léčit osmotickými laxativy
5. U dětí s růstovým selháním navazujícím na intrauterinní růstovou retardaci vede terapie růstovým hormonem ke:
 - a) snížení poměru svalové a tukové hmoty
 - b) zvýšení poměru svalové a tukové hmoty
 - c) zvýšení rizika diabetu
 - d) prevenci osteoporózy a fraktur
6. Od kterých psychických stavů si dospívající ulevují? Jmenujte dvě hlavní skupiny těchto stavů:
 - a) od deprese nebo disociace
 - b) od silné negativní emoce (např. hněv, úzkost) nebo disociace
 - c) od paniky nebo jiné silné negativní emoce (např. hněv, úzkost)
 - d) od derealizace nebo depersonalizace
7. Je-li u pětiletého kojence zjištěn syndrom excesivního pláče, je vhodné mimo jiné:
 - a) jeho rodičům doporučit, aby omezili fyzický kontakt s dítětem, protože excesivní pláč je důsledkem přílišné péče o dítě a prvním projevem jeho „rozmazlenosti“
 - b) zajímat se i o to, jak situaci prožívají rodiče dítěte, a upřímně je podpořit v jejich nelehké situaci
 - c) naučit rodiče základní tišící techniky a doporučit jim, aby, je-li to možné, zvýšili frekvenci i délku fyzického kontaktu s dítětem (a to i v době mezi záchvaty pláče)
 - d) doporučit matce, aby přestala dítě kojit, neboť jednoznačnou příčinou excesivního pláče je nesnášenlivost mateřského mléka
8. Beta-glukany jsou:
 - a) hlavní stavební součástí bakteriální buňkové stěny
 - b) v sirupové formě vhodné už od 1 roku věku
 - c) jako definované molekulární struktury stimulují zejména specifickou imunitu
 - d) tvořeny monomerními jednotkami glukózy
9. Nejčastější indikací k tonzilektomii u dětí jsou:
 - a) recidivující angíny
 - b) paratonzilární absces
 - c) hypertrofie tonzil, způsobující sleep apnoe syndrom
 - d) nádor tonzily
10. Herpanginu vyvolávají:
 - a) enteroviry
 - b) coxsackie
 - c) herpetické viry
 - d) echoviry
11. Při serózní rýmě, způsobené virovým zánětem u 2letého dítěte, je nyní nejčastěji doporučován tento postup:
 - a) antibiotika + antihistaminika lokálně
 - b) adrenalin a borová kyselina v kapkách
 - c) výplachy nosu solným roztokem (mořská voda, 0,9% NaCl...)
 - d) antihistaminika celkově
12. Vestřevní mikrobiální flóra alergiků jsou méně zastoupené:
 - a) bakterie rodu Clostridium
 - b) bakterie rodu Bifidobacterium
 - c) bakterie rodu Enterococcus
 - d) bakterie rodu Staphylococcus

Správné odpovědi: 1 b; 2 c; 3 c; 4 c; 5 b; 6 b; 7 b; 8 b; 9 a; 10 a, b, d; 11 c; 12 b, c