

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Ego-dystonní sexuální orientace je:

- a) taková, která je v souladu s cítěním nositele, které se nebrání, se kterou se ztotožňuje
- b) která je v rozporu s cítěním nositele, která mu způsobuje vnitřní konflikt, kterou by rád změnil
- c) s níž se nositel narodil a nechce ji změnit
- d) je to homosexuální orientace

2 Klinický efekt bifidobakterií byl prokázán:

- a) v terapii Crohnovy nemoci
- b) v prevenci astmatu
- c) v prevenci nekrotizující enterokolitidy
- d) v léčbě atopické dermatitidy

3 Trombiculosis je:

- a) běžná svědivá vyrážka dětí i dospělých v letních měsících
- b) vyvolána larvami sametek
- c) je silně infekční mezi dětmi v kolektivu
- d) pouze dětské kožní onemocnění

4 Dočasné tetování „černou henou“ je:

- a) rizikové pro obsah PPD v používané barvě
- b) bezvýznamný módní výstřelek pro mladistvé
- c) tradiční způsob slavnostního zdobení v orientu
- d) častá příčina kontaktního alergického ekzému u dětí a mladistvých

5 Který nejčastější typ mastocytózy se u dětí vyskytuje?

- a) solitární mastocytom
- b) teleangiectasia macularis eruptiva perstans
- c) urticaria pigmentosa
- d) exrakutánní mastocytom

6 Jaká je běžná terapie kožní formy mastocytózy, pokud je vyžadující?

- a) celková terapie antihistaminiky H1, lokální kortikosteroidy
- b) celková terapie antihistaminiky H1 a H2
- c) celková terapie Nalcromem
- d) celková terapie kortikosteroidy

7 Mezi rizikové faktory trvalého postižení ledvin u HSPN nepatří:

- a) nefrotický syndrom
- b) makroskopická hematurie
- c) hypertenze
- d) renální insuficience

8 Mezi příznaky HSP nepatří:

- a) artralgie
- b) bolesti břicha
- c) meléna
- d) dysurické obtíže

9 Podání erymasy a trombonáplavu v paliativní péči:

- a) není indikováno, protože zbytečně prodlouží umírání
- b) je indikováno dle hodnot krevního obrazu
- c) je indikováno, pokud očekáváme zlepšení kvality života
- d) není indikováno jako ekonomicky nevýhodné

10 Před alergologickým vyšetřením vysadíme (pokud to stav dítěte dovolí):

- a) perorální antihistaminika
- b) perorální i topická antihistaminika
- c) inhalační a intranazální steroidy
- d) všechny odpovědi jsou správné

11 Před laboratorním vyšetřením specifických IgE protilátek vysadíme:

- a) antihistaminika
- b) topické kortikosteroidy
- c) specifickou alergenovou imunoterapii
- d) není třeba žádnou přípravu, léky i vakcíny ponecháme

12 Od kterého věku doporučujeme zahájit specifickou alergenovou imunoterapii pylovými vakcínami?

- a) od 12 let
- b) obvykle od 5 let, ale je snaha posunout hranici i do časnějších období
- c) od 15 let
- d) po dosažení 2 let života

Správné odpovědi: 1. b 2. c 3. a, b 4. a, b 5. c 6. a 7. b 8. d 9. c 10. b 11. d 12. b