

Vážení čtenáři, na stránkách *Pediatric pro praxi* se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle. Za 80% úspěšnost řešení máte možnost získat 6 kreditů ČLK. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Vakcíny proti rotavirům jsou doporučovány:

- a) dětem v rozvojových zemích a dětem s rizikovými faktory v zemích vyspělých
- b) kojencům od 6. týdne věku
- c) dětem do stáří jednoho roku
- d) podávat odděleně od ostatních vakcín, aby nedošlo k interferenci

2 Mezi komplikace rotavirových onemocnění patří:

- a) laryngitida a pneumonie
- b) sekundární střevní bakteriální infekce
- c) poškození srdečních chlopní a myokardu
- d) febrilní křeče

3 Jaká terapie se používá u novorozenců se zjevnými klinickými příznaky kongenitální CMV infekce?

- a) ganciklovir
- b) foscarnet
- c) cidofovir
- d) hyperimunní specifický imunoglobulin

4 Do jaké hodnoty je hladina celkového cholesterolu u dětí považována za normální?

- a) do 3,0 mmol/l
- b) do 3,7 mmol/l
- c) do 4,4 mmol/l
- d) do 5,0 mmol/l

5 Sekundární malignity v mozku nejčastěji vznikají po radioterapii v intervalu:

- a) do 2 let
- b) 7–10 let
- c) 15–18 let
- d) nevznikají vůbec

6 Jak častá je habituální zácpa u dětí s chronickou obstrukcí?

- a) 50 %
- b) 60 %
- c) 80 %
- d) 95 %

7 Polyetylglykol (macrogolum 4000) je při léčbě chronické zácpy u dětí považován za:

- a) stejně účinný jako laktulóza
- b) méně účinný než laktulóza
- c) více účinný než laktulóza
- d) výsledky jsou rozporuplné

8 Paradoxní průjem je projevem:

- a) dráždivého tračníku u dětí
- b) chronické zácpy

- c) přejídání
- d) získaného dočasného deficitu střevní laktázy pro prodělaném infekčním průjemovým onemocněním

9 Narkolepsie se projevuje:

- a) nadměrnou denní spavostí
- b) chrápáním ve spánku
- c) nepříjemnými pocity v nohou před usínáním
- d) hypnagogickými halucinacemi

10 Denní potřeba vitamínu K u novorozence a malého kojence je:

- a) 1 µg/kg
- b) 1 mg
- c) 1 µg
- d) 1 mg/kg

11 Doporučená délka p. o. profylaxe pozdní krvácivé nemoci činí:

- a) 12 týdnů (u plně živých formulí)
- b) 6 měsíců (u plně kojených)
- c) 6 měsíců u všech
- d) 12 týdnů u plně kojených

12 K diagnostice mimoplicní formy tuberkulózy je nejdůležitější:

- a) pozitivní tuberkulinový test Mx. II.
- b) pozitivní QuantiFERON TB-Gold test
- c) histologické vyšetření biopsického vzorku
- d) bakteriologický průkaz

13 Nejčastějším pozdním následkem kongenitální CMV infekce může být:

- a) poškození zraku
- b) poškození sluchu
- c) poškození růstu
- d) poruchy výživy

14 Bronchiolitis acuta vyvolané RSV je typické onemocnění:

- a) dospělých
- b) školních dětí
- c) kojenců narozených s nízkou porodní hmotností
- d) nic z uvedeného není správně

15 Léky volby při bronchopneumonii vyvolané *Mycoplasma pneumoniae* jsou:

- a) cefalosporin III. generace
- b) aminopeniciliny
- c) penamecilin
- d) makrolidy

16 U kterého z dětí budete v diagnostické rozvaze uvažovat o průduškovém astmatu?

- a) Osmiměsíční chlapec, který prodělal v prvním půl roce života dvě epizody pískotů při dýchání v rámci akutní respirační infekce. Klinický stav dítěte nevyžadoval hospitalizaci ani léčbu celkovými glukokortikoidy. Vyrůstá v rodině kuřáků spolu se 4letým bratrem, který navštěvuje mateřskou školu.
- b) Šestiletá dívka s atopickou dermatitidou a převážně nočním kašlem smíšeného charakteru (dráždivý i vlhký), častou rýmou (vodnatá i hnisavá), huhňavým hlasem, občasným dýcháním ústy a chrápáním.
- c) Desetiměsíční chlapec s pískoty při dýchání, které se objevují nejen při akutní respirační infekci, ale i při smíchu a pohybové aktivitě. Jeho matka je pro průduškové astma od 10 let věku léčena inhalačními kortikosteroidy.
- d) Dvanáctiletá dívka, která prodělala před 6 týdny akutní respirační infekci s horečnatým průběhem. Od té doby má během dne záchvaty tracheálního kašle, které jí znemožňují školní docházku. Kašel se nikdy neobjevil během hlubokého spánku. Farmakoterapie salbutamolem a antitusiky je neúčinná.

17 U kterého z výše uvedených dětí je třeba provést rinoendoskopické vyšetření k vyloučení adenoidní vegetace?

18 Antibiotika jsou v klinické praxi používána:

- a) téměř 60 let
- b) téměř 70 let
- c) téměř 80 let
- d) téměř 90 let

19 Vlastním smyslovým orgánem sluchu je:

- a) Cortiho orgán
- b) hlemýžď
- c) třmínek
- d) Eustachova trubice

20 S očkováním proti rotavirovým infekcím se začíná:

- a) ve 2. měsíci života
- b) v 6. měsíci života
- c) při porodu
- d) 1. den 15. měsíce života

Návratka – Pediatrie pro praxi

AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 1/2011

Do odpovědní tabulky vyznačte své odpovědi – alespoň jedna je vždy správná. Vyplněnou ji pošlete na adresu redakce (Solen, Lazecská 297/51, 779 00 Olomouc) v obálce zřetelně označené „**TEST**“ v termínu do konce března 2011 – rozhoduje razítko na obálce. Za 80% úspěšnost řešení Vám bude přiděleno 6 kreditů ČLK – pozor, platí pouze pro lékaře v České republice. Správné řešení najdete v příštím čísle.

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. a b c d | 11. a b c d |
| 2. a b c d | 12. a b c d |
| 3. a b c d | 13. a b c d |
| 4. a b c d | 14. a b c d |
| 5. a b c d | 15. a b c d |
| 6. a b c d | 16. a b c d |
| 7. a b c d | 17. a b c d |
| 8. a b c d | 18. a b c d |
| 9. a b c d | 19. a b c d |
| 10. a b c d | 20. a b c d |

Jméno a příjmení:

Adresa pracoviště:

Doručovací adresa
(pokud je jiná jako adresa pracoviště):

Tel.:

E-mail:

Registrační číslo v ČLK:

Datum:

Razítko lékaře a podpis:

V souladu s ustanovením § 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou data využita k jiným účelům.

Více informací najdete na

www.pediatricpropraxi.cz