

Vážení čtenáři, na stránkách *Pediatric pro praxi* se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle. Za 80% úspěšnost řešení máte možnost získat 6 kreditů ČLK. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Pacienta neprodleně odesíláme k endokrinologovi, vyjma jedné situace:

- a) při bolestivosti štítné žlázy při současném infektu HCD
- b) když jsou symptomy hypercirkulace při zvýšených hladinách tyroidálních hormonů
- c) když jsou zvětšené a citlivé krční a podčelistní uzliny při infektu HCD
- d) pokud vidíme nebo palpujeme solitární uzel v laloku štítné žlázy, ale uzliny regionální zvětšené nejsou a dítě nejvíe známky dysfunkce štítné žlázy

2 Protrahovaná horečka nereagující na antibiotika může být projevem:

- a) akutní pyelonefritidy
- b) systémové formy juvenilní artritidy
- c) akutní lymfoblastické leukemie
- d) Crohnovy nemoci

3 Pravidelně recidivující horečnatá povlaková angína u jinak zcela zdravého batolete:

- a) je nejčastěji způsobena opakovanou infekcí betahemolytickým streptokokem skupiny A (BHS)
- b) pokud je provázena vysokým CRP, měla by být vždy léčena antibiotikem
- c) mohla by být projevem syndromu periodické horečky
- d) je důvodem pro důsledné hledání mikrobiologického průkazu přítomnosti BHS před započítím antibiotické léčby

4 Hereditární syndromy periodické horečky:

- a) jsou charakterizované autosomálně dominantním nebo recesivním typem dědičnosti
- b) jsou způsobeny poruchou vrozených imunitních mechanismů
- c) v atakách horečky jsou provázeny vysokou nespecifickou zánětlivou aktivitou
- d) léčí se substitučními dávkami imunoglobulinů

5 Mezi příznaky typického D+HUS nepatří:

- a) anemie
- b) akutní renální selhání
- c) trombocytóza
- d) migrující artritida

6 HUS může být vyvolán:

- a) reakcí organismu na vysokou fyzickou zátěž
- b) malignitami
- c) pneumokokovou infekcí
- d) špatně korigovanou hypertenzí

7 Nejčastější otogenní intrakraniální komplikací v dětském věku je:

- a) mozkový absces
- b) perisinuozní absces
- c) meningitida
- d) trombóza esovitého splavu

8 Nejčastějším bakteriálním původcem akutního zánětu středouší je:

- a) *Haemophilus influenzae*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Streptococcus pyogenes*
- d) *Streptococcus pneumoniae*

9 Klinický obraz urticaria factitia je charakterizován:

- a) malé folikulárně vázané pomfy na trupu
- b) podélné uspořádání pomfů v místech škrábání nebo tření kůže
- c) svědění předchází výsevu kopřivky
- d) plastický dermatografismus

10 Nejčastější příčinou chronické kopřivky jsou:

- a) reakce na potraviny a potravinářská aditiva
- b) antibiotika
- c) autoimunitní mechanismy
- d) latex

11 Mezi hlavní diagnostická kritéria urtikariální vaskulitidy patří:

- a) přetrvávání pomfů déle než 24 hodin
- b) svědění
- c) leukocytoklasie v histologickém obraze
- d) dobrá odpověď na léčbu antihistaminiky

12 Které jsou nejčastější mykotické infekce u nedonošenců a novorozenců?

- a) *Candida species*
- b) *Aspergillus species*
- c) *Fusarium species*
- d) *Cryptococcus species*

13 Fungémie:

- a) je prokázána zachytem komponent buněčné membrány plísni (např. manan, galaktomanan) v periferní krvi
- b) může být zastižena u invazivních infekcí způsobených kvasinkami
- c) je nejčastějším příznakem jakékoliv diseminované mykotické infekce
- d) je charakterizována mikrobiologickým průkazem (mikroskopie, kultivace) mykotického patogena v periferní krvi

14 Měření hladin léku v krvi (TDM) se používá u dětí při podávání:

- a) polyenů
- b) azolů
- c) echinokandinů
- d) glukonů

15 Neléčené úzkostné poruchy v dětství zvyšují v adolescenci riziko výskytu:

- a) schizofrenie
- b) sebevražedných tendencí a zneužívání drog
- c) demence
- d) posttraumatické stresové poruchy

16 Dva vrcholy nejčastějšího výskytu sociální fobie jsou:

- a) 10 a 18 let
- b) 2 a 8 let
- c) 11 a 16 let
- d) 5 a 13 let

17 K predilekční lokalizaci scabies u kojenců patří:

- a) extenzorové plochy končetin

- b) dlaně a plosky
- c) kštiny
- d) axily

18 Trombidiáza je způsobená:

- a) klíšťaty
- b) larvou roztoče sametky podzimní
- c) vši šatní
- d) štěnicí

19 Jediný zachránce u kojence při KPR střídá stlačení hrudníku s umělými vdechy v poměru:

- a) 15:2
- b) 3:1
- c) 30:2
- d) 5:1

20 Při defibrilaci je doporučovaná energie defibrilačního výboje u dětí:

- a) co nejvyšší
- b) $1-2 \text{ j} \times 1 \text{ kg}^{-1}$
- c) $12 \text{ j} \times \text{kg}^1$
- d) $4 \text{ j} \times \text{kg}^1$

Správné řešení z minulého čísla: 1. b 2. d 3. a, d 4. c 5. b 6. d 7. c 8. b 9. a, d 10. c 11. d 12. d 13. b 14. c 15. d 16. c 17. b 18. b 19. a 20. a

Návratka – Pediatrie pro praxi**AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 2 / 2011**

Do odpovědní tabulky vyznačte své odpovědi – alespoň jedna je vždy správná. Vyplněnou ji pošlete na adresu redakce (Solen, Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc) v obálce zřetelně označené „TEST“ v termínu do konce května 2011 – rozhoduje razítko na obálce. Za 80% úspěšnost řešení Vám bude přiděleno 6 kreditů ČLK – pozor, platí pouze pro lékaře v České republice. Správné řešení najdete v příštím čísle.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. a b c d | 11. a b c d |
| 2. a b c d | 12. a b c d |
| 3. a b c d | 13. a b c d |
| 4. a b c d | 14. a b c d |
| 5. a b c d | 15. a b c d |
| 6. a b c d | 16. a b c d |
| 7. a b c d | 17. a b c d |
| 8. a b c d | 18. a b c d |
| 9. a b c d | 19. a b c d |
| 10. a b c d | 20. a b c d |

Jméno a příjmení:

Adresa pracoviště:

Doručovací adresa
(pokud je jiná jako adresa pracoviště):

Tel.:

E-mail:

Registrační číslo v ČLK:

Datum:

Razítko lékaře a podpis:

V souladu s ustanovením § 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou data využita k jiným účelům.

Více informací najdete na

www.pediatriepropraxi.cz