

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Mezi atypické mikroby nepatří:

- a) Francisely
- b) Rickettsie
- c) Moraxelly
- d) Legionely

2 Chlamydiové konjunktivitidy u kojenců se léčí:

- a) betalaktamy
- b) tetracykliny
- c) aminoglykosidy
- d) makrolidy

3 Legionela pneumophila je mikrob:

- a) termofilní
- b) kryofilní
- c) slanofilní
- d) vodní

4 Nejčastější pozdní komplikací akutní purulentní meningitidy, která je zjistitelná zobrazovacími technikami, je:

- a) trombóza žilních splavů
- b) mozkový absces
- c) subdurální efúze
- d) osteomyelitida báze lebni

5 Mezi nejčastější vyvolavatele purulentních meningitid v dětském věku patří:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Streptococcus viridans
- d) Staphylococcus aureus

6 K častějším příčinám torticollis u batolat patří:

- a) Sandiferův syndrom
- b) léze zadní jámy lebni
- c) vertebrogenní onemocnění
- d) intraspinální tumor

7 Reaktivní zduření nosní sliznice vzniká při dlouhodobé lokální léčbě:

- a) antihistaminiky
- b) kromony
- c) agonisty alfa adrenergických receptorů
- d) kortikosteroidy

8 Lékem volby purulentní meningitidy v dětském věku je:

- a) klindamycin
- b) tetracyklin
- c) chloramfenikol
- d) cefotaxim

9 První zkušenost s alkoholem mají české děti:

- a) v 6 letech
- b) v 8 letech
- c) v 11 letech
- d) v 15 letech

10 V Evropské unii je ČR v množství vypitého alkoholu u mládeže od 16 let věku:

- a) na 1. místě
- b) na 4. místě
- c) na 8. místě
- d) na 12. místě

11 Hlavní význam pneumokokové vakcinace spočívá v:

- a) prevenci katarů horních cest dýchacích
- b) zvyšování kolektivní imunity populace a snižování incidence respiračních nákaz
- c) prevenci invazivních pneumokokových onemocnění, zánětů středouší a nazofaryngeálních kolonizací
- d) v doplnění komplexnosti dětského očkovacího kalendáře

12 Očkování proti infekci HPV typů 6, 11, 16 a 18 je primární prevencí:

- a) ulcus molle
- b) 80 % karcinomů hrdla děložního a 90 % genitálních kondylomat
- c) 99 % karcinomů hrdla děložního a 5 % karcinomu penisu
- d) perzistentní infekce těmito viry

Správné odpovědi: 1. c, 2. d, 3. a, d, 4. c, 5. b, 6. a, b, 7. c, 8. d, 9. b, 10. b, 11. c, 12. b, d