

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nejčastějším mykotickým patogenem u dětí hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče je:

- a) *Aspergillus species*
- b) *Candida species*
- c) *Cryptococcus species*
- d) *Fusarium species*

2 Flukonazol není účinný proti běžným kmenům:

- a) *Candida species*
- b) *Aspergillus species*
- c) *Cryptococcus species*
- d) *Histoplasma*

3 Mezi příčiny hypertonické poruchy u novorozence a kojence patří:

- a) hypoxicko-ischemická encefalopatie
- b) Downův syndrom
- c) gastroezofageální reflux
- d) neonatální abstinční syndrom

4 Na preventivní prohlídce v 5 letech zjistíme u děvčete asymetrické zvětšení prsní žlázy M3, výraznější vlevo:

- a) pacientku pošleme na chirurgii k vyloučení rakoviny prsu
- b) jedná se o urychlení puberty, které je v současné době v rámci sekulárního trendu zcela běžné a nevyžaduje zvláštní pozornost
- c) pacientku pošleme na endokrinologii k vyloučení předčasné puberty
- d) necháme provést sonografické vyšetření prsu a pacientku pozveme za rok na kontrolu

5 V léčbě alergické rýmy u dětí jsou intranazální glukokortikoidy:

- a) všechny kontraindikovány
- b) indikovány pouze takové, u kterých nebyl prokázán vliv na růst dětí
- c) všechny indikovány
- d) indikovány pouze s antihistaminikem

6 Nejčastějším chronickým alergickým onemocněním u dětí je:

- a) atopický ekzém
- b) konjunktivitida
- c) alergická rýma
- d) bronchiální astma

7 Nejčastější příčinou smrti pacientek s mentální anorexií je:

- a) kardiovaskulární selhání
- b) zánětlivá komplikace
- c) sebevražda
- d) extrémní přejedení

8 Mezi specifická kraniocerebrální poranění v novorozeneckém věku patří:

- a) kefalhematom
- b) difúzní axonální poranění
- c) fraktura báze lebny
- d) fraktura kalvy typu ping-pongového míčku

9 Vyberte pravdivé tvrzení:

- a) Přeočkování proti KME je u mladších jedinců doporučováno 1x za tři roky.
- b) Nejnížší proočkovanosť proti KME v České republice je v Jihočeském kraji.
- c) Sama infekce RNA viru KME neznámá nutně rozvoj neuroinfekce.
- d) Ze dvou tisíc vajíček *Ixodes ricinus* se vyvine asi 10 larev.

10 Kongenitální adrenální hyperplazie se může diferencielně diagnosticky podobat:

- a) předčasné adrenarché
- b) předčasné telarché
- c) předčasné gonadarché
- d) předčasné spermaché

11 U dítěte s centrálním hypertonickým syndromem je třeba vyloučit postižení:

- a) gastrointestinální
- b) interní
- c) centrální nervové soustavy
- d) revmatoidní

12 Pacienti s dědičnou poruchou glykosylace typu Ib nemívají na rozdíl od typu Ia:

- a) hypotonii
- b) atypické rozložení podkožního tuku
- c) strabismus
- d) postižení centrální nervové soustavy

Správné odpovědi: 1. b, 2. b, 3. a, c, d, 4. c, 5. b, 6. c, 7. c, 8. a, d, 9. c, 10. a, 11. a, b, c, 12. d