

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Akutní krční lymfadenopatie u dětí je nejčastěji způsobena:

- a) bakteriemi a viry
- b) atypickými mykobakteriemi
- c) nádorem
- d) je projevem metabolické vady

2 V terapii novorozeneckých křečů se obvykle nepoužívá:

- a) fenobarbital
- b) lamotrigin
- c) fenytoin
- d) diazepam

3 80 % všech poranění velkých dýchacích cest se nachází:

- a) uprostřed délky průdušnice
- b) v oblasti krku
- c) v místě kariny
- d) 2 cm nad karinou

4 Pro průkaz dlouhodobé (řádově týdny před porodem) intrauterinní expozice drogám se u novorozence nehodí:

- a) smolka
- b) moč
- c) krev
- d) vlasy

5 Miliární tuberkulóza se šíří:

- a) aerogenně
- b) lymfogenně
- c) hematogenně
- d) per continuitatem

6 Oligomenorea je nejčastější porucha menstruačního cyklu u dospívajících dívek. Léčí se:

- a) vždy
- b) není potřeba žádné léčení
- c) jen když krvácení je příliš časté, příliš silné a příliš dlouhé
- d) podáním hormonální antikoncepce

7 Porucha bariérové funkce kůže u atopického ekzému je způsobena:

- a) alergií na bílkoviny kravského mléka
- b) mutací genu pro protein fillagrin
- c) osídlením kůže zlatým stafylokokem
- d) deficiencí ceramidů ve stratum corneum

8 Dočasné řezáky obvykle prořezávají:

- a) ve 2.–3. měsíci života dítěte
- b) v 6.–8. měsíci
- c) v 10.–12. měsíci
- d) ve 12.–14. měsíci

9 Přenos *Streptococcus mutans* do dutiny ústní dítěte se nejčastěji uskutečňuje:

- a) prostřednictvím potravy bohaté na sacharidy
- b) vkládáním hraček do úst
- c) slinou od matky
- d) používáním nevhodných pomůcek pro ústní hygienu

10 Silné opioidy u dětí:

- a) zásadně nepoužíváme
- b) podáváme jen za hospitalizace
- c) použijeme v závislosti na síle bolesti
- d) smí použít jen anesteziolog

11 Hodnota CRP svědčící pro bakteriální infekci je:

- a) > 10 mg/l
- b) > 60 mg/l
- c) 0,8 µg/l
- d) 30–50 mg/l

12 Správná délka léčby infekce vyvolané *Streptococcus pyogenes* (spály, spalové anginy) je:

- a) 7 dnů
- b) ještě 3 dny po odeznění bolesti v krku
- c) 10 dnů
- d) 3 týdny

Správné odpovědi: 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. c, 6. c, 7. b, d, 8. b, 9. c, 10. c, 11. b, 12. c