

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Vakcíny proti rotavirovým infekcím dostupné v ČR se jmenují:

- a) Rotarix a RotaTeq
- b) Rotashield a Rotarix
- c) Rotalex a RotaTeq
- d) Rotamune a Rotavac A

2 S očkováním proti rotavirovým infekcím se začíná:

- a) ve 2. měsíci života
- b) v 6. měsíci života
- c) při porodu
- d) 1. den 15. měsíce života

3 Jaké vyšetření je nutné ke správné diagnostice obstrukční spánkové apnoe u dětí?

- a) stačí anamnestické údaje
- b) ORL vyšetření
- c) noční polysomnografie
- d) noční oxymetrie

4 Průběh popáleninového úrazu má:

- a) 3 období (neodkladné, akutní, rekonstrukční a rehabilitační)
- b) 2 období (akutní a chronické)
- c) 4 období (neodkladné, akutní, období hojení, rekonstrukční a rehabilitační)
- d) 1 období péče o popáleninový úraz

5 Hlavním rozdílem mezi keloidní a hypertrofickou jizvou je:

- a) keloidní jizva nepřerůstá okraje původní léze
- b) hypertrofická jizva více svědí
- c) keloidní jizva přerůstá okraje původní léze
- d) keloidní jizva dobře reaguje na tlakovou terapii

6 Diagnostika alergické rýmy není založena na:

- a) alergologických testech
- b) symptomech kýchání a svědění
- c) rtg paranazálních dutin
- d) kvalitní anamnéze

7 Mezi komorbidity alergické rýmy nepatří:

- a) hyperplazie adenoidní tkáně
- b) astma
- c) alergická konjunktivitida
- d) chronická rinosinusitida

8 Reverze katabolizmu v časném postnatálním období je zajištěna přísunem:

- a) 0,5 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti
- b) 1,0 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti
- c) 1,5–2,0 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti
- d) 4 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti

9 Všechny komerčně dostupné fortifikátory mateřského mléka obsahují:

- a) minerály
- b) laktózu
- c) vitamíny
- d) proteiny

10 Mezi společné rysy alergické rýmy a astmatu nepatří:

- a) bledost sliznic
- b) hyperreaktivita
- c) chronický průběh
- d) alergický zánět

11 Laboratorní průkaz rotavirových infekcí se v ČR nejčastěji provádí:

- a) kultivací
- b) ELISA testy
- c) imunochromatografickými testy
- d) detekcí protilátek

12 Po přidání obvyklé dávky fortifikátu do 100 ml mateřského mléka je výsledný obsah proteinů:

- a) 1–1,5 g
- b) 2–2,5 g
- c) 3 g
- d) 4 g

Správné odpovědi: 1. a 2. a 3. c 4. a 5. c 6. c 7. a 8. c 9. a, d 10. a 11. c 12. b