

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nejlepších výsledků s ohledem na celkový vývoj dítěte dosahujeme u centrální předčasné puberty při léčbě analogem gonadoliberinu tehdy:

- a) pokud léčbu podáváme co nejdříve
- b) pokud léčbu zahájíme co nejdříve po objevení příznaků puberty a potvrzení diagnózy a pokud léčbu ukončíme nejpozději při kostním věku 12 let u dívek a 14 let u chlapců
- c) pokud se při ukončení léčby řídíme dosažením kalendářního věku 13 let u dívek a 14 let u chlapců
- d) pokud zahájíme léčbu u dívky s pokročilým stupněm vývoje a s významným urychlením kostního věku, ale ještě před menarchí

2 HPV vakcíny by měly být doporučovány zejména ženám nebo dívkám:

- a) plánujícím v dohledné době otěhotnění
- b) před zahájením pohlavního života
- c) před první menstruací
- d) často cestujícím do zahraničí

3 Ke změnám semenotvorných tubulů varlete vlivem torze může dojít:

- a) až za 24 hodin od objevení se potíží
- b) již po 1 hodině od objevení se potíží
- c) po 6 hodinách od objevení se potíží
- d) nedochází nikdy

4 Pro diagnostiku akutní ledvinné koliky není přínosem:

- a) vyšetření močového sedimentu a chemický rozbor moči
- b) ultrasonografie ledvin a močových cest
- c) statická scintigrafie (DMSA)
- d) nativní spirální počítačový tomogram břicha

5 Použití bakteriálních imunomodulátorů u infekcí dýchacích cest je (na základě současných známých studií) účelné a ekonomické:

- a) kdykoliv preventivně, aby následně nebylo dítě nemocné
- b) pouze u stavů, kdy se u dítěte vyskytnou 3 a více infekcí za rok
- c) pouze u stavů, u kterých není dostatečně účinná ATB léčba
- d) pouze u častých infekcí dolních dýchacích cest

6 Bakteriální imunomodulátory pro léčbu u dětí jsou vázány na lékařský předpis:

- a) pouze specialisty alergologa/klinického imunologa
- b) na předpis praktického lékaře pro děti a dorost po doporučení specialistou
- c) některé jsou vázané na předpis lékaře bez omezení odborností, některé jsou volně prodejné bez receptu

- d) nejsou vázány na předpis lékařem, všechny jsou volně prodejné

7 Bakteriální imunomodulátory:

- a) nahrazují léčbu ATB
- b) používají se u stavů, u kterých není ATB léčba účinná
- c) nenahrazují ATB léčbu, ale jejich správné použití u častých infekcí významně snižuje spotřebu ATB a četnost infekcí
- d) s antibiotiky se nesmí nikdy kombinovat

8 Vyberte správné tvrzení:

- a) Primární ciliární dyskineze (PCD) je získané onemocnění dýchacích cest
- b) PCD je porucha se zhoršeným samoočišťováním dýchacích cest
- c) elektronová mikroskopie je součástí první linie diagnostiky při podezření na PCD
- d) PCD je častější než astma bronchiale jako příčina rekurentních pneumonií

9 Xylomethazolin v koncentraci 0,05 % indikujeme:

- a) u dospělých
- b) u dětí od 7 let věku
- c) u dětí starších 2 let
- d) je zcela kontraindikován

10 Biopsie se u dětí s první atakou nefrotického syndromu provádí:

- a) vždy před zahájením léčby
- b) v případě kortikorezistence
- c) v případě, že se NS vyskytne mezi druhým a šestým rokem věku
- d) v případě nízké C3 složky komplementu

11 Na vzniku kožních projevů atopického ekzému se podílí:

- a) genetická dispozice
- b) imunologická dysbalance
- c) vliv faktorů zevního prostředí
- d) porucha funkce kožní bariéry

12 Lokální imunomodulátory při atopické dermatitidě:

- a) jsou účinnější než zevně aplikované kortikosteroidy
- b) mohou se kombinovat s kortikoidními externy
- c) neaplikují do 2 let věku
- d) paracetamol perorálně může redukovat jejich event. přechodné pálení

Správné odpovědi: 1. b 2. b 3. b 4. c 5. b 6. c 7. c 8. b 9. c 10. b, d 11. a, b, c, d 12. b, c, d