

Vážení čtenáři, na stránkách Pediatrie pro praxi se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle. Za 80% úspěšnost řešení máte možnost získat 6 kreditů ČLK. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Podle současných doporučení je u malého dítěte s průduškovou obstrukcí lékem první volby:

- a) prednison p.o. v dávce 1–2 mg/kg/den rozděleně ve 3 dávkách v průběhu dne
- b) salbutamol inhalačně v pravidelných intervalech
- c) theophyllin podaný p.o. nebo parenterálně dle stavu
- d) vysoká dávka inhalačních kortikosteroidů (200–400 µg/dávku) podávaná několikrát denně

2 Dítě v předškolním věku považujeme za rizikové z hlediska rozvoje průduškového astmatu, pokud:

- a) je u něj prokázána alergická senzibilizace na některý z potravinových alergenů
- b) průdušková obstrukce se vyskytuje i mimo období nachlazení
- c) v krevním obraze je relativní zastoupení eozinofilů čtyři nebo více procent
- d) je prokázána alergická senzibilizace na vzduchem přenášenou látku

3 Pro myotonickou dystrofii (MD1) platí:

- a) mírná forma onemocnění může být asymptomatická
- b) stupeň postižení kosterních svalů odpovídá postižení myokardu
- c) rizikovými faktory pro postižení srdce jsou mužské pohlaví, vyšší věk, délka CTG tripletů při analýze DNA
- d) diagnózu stanovujeme na základě DNA analýzy, EMG, klinického obrazu

4 S jakou frekvencí se vyskytuje posttraumatický hypopituitarismus u dětí a adolescentů?

- a) méně než 5 %
- b) 5–10 %
- c) 15–20 %
- d) více než 50 %

5 Příčinu syndromu náhlého ohrožení života lze určit:

- a) u 10 % případů
- b) u 30 % případů
- c) u 50 % případů
- d) u 80 % případů

6 Mezi základní formy akné nepatří:

- a) acne comedonica
- b) acne papulopustulosa
- c) acne conglobata
- d) acne chlorina

7 Mezi lokální akné terapeutika patří:

- a) antibiotika, retinoidy, benzoylperoxid, kyselina azelaová, adapalen

- b) retinoidy, benzoyl peroxid, adapalen, kyselina azelaová, antivirotika
- c) antibiotika, kyselina azelaová, peroxid vodíku
- d) adapalen, kyselina boritá, retinoidy

8 Mezi nepříznivé faktory působící zhoršení atopického ekzému nepatří:

- a) časté mytí mýdlem
- b) plyšové hračky
- c) bavlněné tkaniny
- d) vlněné tkaniny

9 Pro Eczema herpeticatum platí:

- a) onemocnění bývá doprovázeno horečkou, lymfadenitidou, celkovou schváceností
- b) vyvolavatelem jsou viry HPV
- c) onemocnění neohrožuje pacienta na životě
- d) je bakteriální onemocnění

10 Nejčastější závažnou hematologickou komplikací varicelly je:

- a) leukopenie
- b) agranulocytóza
- c) idiopatická trombocytopenická purpura
- d) hemolytická anémie

11 Při zjištění kontaktu s varicellou u ženy v 1. trimestru gravidity s negativní nebo nejasnou anamnézou prodělaného onemocnění:

- a) nejsou potřeba žádná opatření, vnímavé dospělé osoby se v populaci nevyskytují
- b) je potřeba neprodleně vyšetřit specifické IgG v séru
- c) ihned zahájíme podávání acykloviru
- d) je indikováno podání VZIG

12 Který z nálezů je typický/rozhodující pro vezikoureterální reflux?

- a) polyurie s polydipsií
- b) izolovaná hematurie
- c) mikční cystouretrografie
- d) dysurie

13 Obtížná mikce (dítě musí při močení výrazně používat břišní svaly) provázená slabým/přerušovaným proudem moči budí podezření na:

- a) polycystózu ledvin
- b) chlopeň nebo stenózu uretry
- c) urolitiázu
- d) neurovývojovou poruchu označovanou jako ADHD

14 Chirurgické řešení orbitální celulitidy je indikováno v případě:

- a) subperiostálního abscesu
- b) preseptální celulitidy
- c) nezlepšení klinického stavu do 12 hodin od zahájení ATB terapie
- d) protruze bulbu s omezením jeho hybnosti a rozvojem diplopie

15 V jakém věku dítěte je vhodné začít s čištěním chrupu?

- a) jakmile začnou dočasné zuby prořezávat
- b) v 1 roce věku
- c) v 5 letech
- d) v 6 letech

16 Zubní pasta s obsahem 500 ppm fluoridů je vhodná pro:

- a) předškolní děti
- b) školní děti
- c) dospělé
- d) batolata

17 Modifikovaná Stillmanova technika čištění chrupu se doporučuje pro:

- a) mladší školní věk
- b) starší školní věk
- c) pro předškolní děti
- d) pro batolata

18 Ústní vodu mohou pravidelně používat děti:

- a) od věku 2 let
- b) každé věkové kategorie
- c) od věku 6 let
- d) používání ústních vod není u dětí vhodné

19 Infadolan mast obsahuje:

- a) azulen a bisabolol
- b) skvalen
- c) retinoli acetat a ergocalciferolum
- d) clotrimazol

20 Oilatum Emollient obsahuje:

- a) paraffinum perliquidum
- b) směs lipidoacidoesterů
- c) rafinovaný sójový olej
- d) azulen a bisabolol

Správné řešení z minulého čísla: 1. c 2. d 3. b 4. d 5. a 6. d 7. d 8. d 9. a, b, c, d 10. a, c, d
11. a, b, d 12. d 13. b 14. b, c, d 15. c, d 16. b 17. c, d 18. a 19. b, c 20. a, d

Návratka – Pediatrie pro praxi**AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 5 / 2011**

Do odpovědní tabulky vyznačte své odpovědi – alespoň jedna je vždy správná. Vyplněnou ji pošlete na adresu Solen, Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc v obálce zřetelně označené „TEST“ v termínu do konce listopadu 2011 – rozhoduje razítko na obálce. Za 80% úspěšnost řešení Vám bude přiděleno 6 kreditů ČLK – pozor, platí pouze pro lékaře v České republice. Správné řešení najdete v příštím čísle.

1. a b c d	11. a b c d
2. a b c d	12. a b c d
3. a b c d	13. a b c d
4. a b c d	14. a b c d
5. a b c d	15. a b c d
6. a b c d	16. a b c d
7. a b c d	17. a b c d
8. a b c d	18. a b c d
9. a b c d	19. a b c d
10. a b c d	20. a b c d

Jméno a příjmení:

Adresa pracoviště:

Doručovací adresa
(pokud je jiná jako adresa pracoviště):

Tel.:

E-mail:

Registrační číslo v ČLK:

Datum:

Razítko lékaře a podpis:

V souladu s ustanovením § 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou data využita k jiným účelům.