

Vážení čtenáři, na stránkách Pediatrie pro praxi se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle. Za 80% úspěšnost řešení máte možnost získat 6 kreditů ČLK. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Terapeutická hypotermie v léčbě HIE novorozenců:

- a) spočívá v krátkodobém ochlazení novorozence na tělesnou teplotu okolo 30°C
- b) je v této indikaci relativně bezpečnou a efektivní metodou zlepšující prognózu novorozenců
- c) je často spojena se závažnými a nebezpečnými komplikacemi ohrožujícími život novorozence
- d) zaručuje normální postnatální vývoj i u těžce asfyktických novorozenců

2 K léčebné hypotermii jsou obvykle indikováni:

- a) donošení novorozenci po perinatální asfyxii s klinickými známkami hypoxicko-ischemické encefalopatie
- b) nedonošení novorozenci s krvácením do postranních mozkových komor
- c) donošení novorozenci s nálezem postischemických změn zjištěných při MRI vyšetření mozku
- d) všichni donošení novorozenci s výskytem křečí v časném poporodním období

3 Vyšetření subtelomerických oblastí se doporučuje u:

- a) zdravých nosičů vyvážené (balancované) translokace
- b) dětí s Downovým syndromem
- c) dětí s mentální retardací lehkého stupně
- d) dětí s těžkou formou idopatické mentální retardace nebo u dětí s atypickým fenotypem

4 I přes multidisciplinární péči zůstává v současnosti nevysvětlených (idiopatických) případů jedinců s mentální retardací:

- a) 5–10 %
- b) 15–25 %
- c) 50–75 %
- d) 80–90 %

5 Prostřednictvím jakých receptorů na imunokompetentních buňkách se uplatňují bakteriální lyzáty při aktivaci těchto buněk?

- a) prostřednictvím HLA receptorů II. třídy
- b) prostřednictvím histaminových H1 receptorů
- c) hlavně prostřednictvím TLR receptorů
- d) prostřednictvím HLA receptorů I. třídy

6 Bakteriální lyzáty používané pro klinické použití jsou:

- a) vázané na lékařský předpis specialisty
- b) jsou volně prodejné
- c) některé jsou volně prodejné, některé jsou na předpis bez vazby na specialistu
- d) vázané na lékařský předpis bez omezení specialisty

7 Celoživotní dispenzarizace pacientů po operaci atrézie jícnu je doporučená pro:

- a) chronické neprospívání způsobené polykacími potížemi
- b) možnost recidivy trachoesofageální píštěle
- c) vysokou incidenci gastroezofageálního refluxu s ezofagitidou, což je stav, který může vést k metaplastickým změnám epitelu
- d) hrozící uváznutí sousta

8 Drsný tracheální kašel způsobený tracheomalácií:

- a) je zvláště v předškolním věku u dětí po operaci atrézie jícnu častý a není důvodem k léčbě antitusiky ani antibiotiky
- b) je indikací k chirurgickému řešení trachomalácie
- c) po dobu trvání je důvodem pro vyloučení dítěte z kolektivu
- d) je vhodné léčit antibiotiky ze skupiny makrolidů

9 Kde je lokalizován otok v případě subglotické laryngitidy?

- a) v celém hrtanu
- b) pouze v oblasti hlasivek
- c) hlavně pod hlasivkami v subglotickém prostoru
- d) onemocnění je bez otoku

10 Základní léčba úvodní fáze středoušního zánětu zahrnuje:

- a) podání analgetik, antipyretik, chladivé obklady na ucho
- b) antibiotickou terapii
- c) provedení paracentézy
- d) nevyžaduje léčbu

11 Hlavní příčina snížené incidence supraglotické laryngitidy je:

- a) včasné nasazení antibiotik
- b) očkování proti Haemophilus influenzae typu B
- c) změna vyvolávající příčiny
- d) intravenózní aplikace kortikoidů

12 Nejčastější komplikace akutní tonzilitidy je:

- a) parafaryngeální absces
- b) peritonzilární absces
- c) trombóza vena jugularis interna
- d) přechod do chronického průběhu

13 Lichen sclerosus et atrophicus postihuje oblast:

- a) genitálu
- b) perianální
- c) jakoukoli oblast kůže
- d) postihuje především sliznice

14 Nejzávažnější komplikací lichen sclerosus et atrophicus vulvae je:

- a) atrofie
- b) sklerotizace
- c) anatomické změny genitálu
- d) spinocelulární karcinom

15 Lichen sclerosus et atrophicus se nejčastěji vyskytuje spolu s:

- a) lichen planus
- b) lupus erythematosus
- c) graft-versus host disease
- d) atopickým ekzémem

16 Predilekční lokalizací akné jsou:

- a) obličej
- b) ramena
- c) třísla
- d) horní partie zad a trupu

17 Pro fyzikální léčbu akné lze použít IPL, cílem je destrukce bakterií. Vhodná barva světla je:

- a) červená
- b) žlutá

- c) modrá
- c) zelená

18 U dívký v hormonálně klidovém období je nejčastějším původcem vulvovaginitidy:

- a) kapavka
- b) bakteriální infekce
- c) roupi
- d) kvasinková infekce

19 Kolik nových případů těžké kombinované imunodeficiency se v České republice každým rokem objeví?

- a) 1–2
- b) 5–10
- c) 20–50
- d) nad 100

20 Mezi velká Jonesova kritéria pro diagnostiku revmatické horečky nepatří:

- a) karditida
- b) revmatický uzlík
- c) horečka
- d) artralgie

Správné řešení z minulého čísla: 1. b 2. d 3. a, c, d 4. c 5. c 6. d 7. a 8. c 9. a 10. c
11. b 12. c 13. b 14. a, d 15. a 16. d 17. b 18. c 19. c 20. a

Návratka – Pediatrie pro praxi**AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 6 / 2011**

Do odpovědní tabulky vyznačte své odpovědi – alespoň jedna je vždy správná. Vyplněnou ji pošlete na adresu Solen, Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc v obálce zřetelně označené „TEST“ v termínu do konce ledna 2012 – rozhoduje razítko na obálce. Za 80% úspěšnost řešení Vám bude přiděleno 6 kreditů ČLK – pozor, platí pouze pro lékaře v České republice. Správné řešení najdete v příštím čísle.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. a b c d | 11. a b c d |
| 2. a b c d | 12. a b c d |
| 3. a b c d | 13. a b c d |
| 4. a b c d | 14. a b c d |
| 5. a b c d | 15. a b c d |
| 6. a b c d | 16. a b c d |
| 7. a b c d | 17. a b c d |
| 8. a b c d | 18. a b c d |
| 9. a b c d | 19. a b c d |
| 10. a b c d | 20. a b c d |

Jméno a příjmení:

Adresa pracoviště:

Doručovací adresa
(pokud je jiná jako adresa pracoviště):

Tel.:

E-mail:

Registrační číslo v ČLK:

Datum:

Razítko lékaře a podpis:

V souladu s ustanovením § 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou data využita k jiným účelům.