



Obr. 2. Podíl pacientů s dosažením PASI90 po 16 týdnech léčby v základních studiích s bimekizumabem v porovnání s placebem a s komparátory (9–12)



Obr. 3. Rychlý nástup účinku bimekizumabu v léčbě psoriázy demonstruje vysoký podíl pacientů s dosažením PASI90 již po 4 týdnech léčby (9–12)



Doložená účinnost bimekizumabu v léčbě ložiskové psoriázy

Bimekizumab prokázal v základních studiích fáze III superioritu v porovnání s placebem (studie BE READY) (10), s ustekinumabem (studie BE VIVID) (9), s adalimumabem (studie BE SURE) (11) a se secukinumabem (studie BE RADIANT) (12)

z hlediska dosažení odpovědi PASI90 v 16. týdnu léčby (všechna $p < 0,001$), (obr. 2). V těchto studiích šlo o koprimary sledovaný parametr.

Významným zjištěním těchto studií je také rychlý nástup účinku bimekizumabu. Již po 4 týdnech léčby, tj. po 1 dávce bimekizumabu dosáhlo PASI 90 v jednotlivých studiích 36–45 % pacientů (obr. 3), což má zejména

v případech těžké psoriázy také významný psychologický efekt.

Doložena byla také dlouhodobá účinnost bimekizumabu. Po 1 roce léčby vedl k dosažení PASI100, tj. úplného vymizení projevů psoriázy, u významně vyššího podílu pacientů než ustekinumab (65 % vs. 38 %, $p < 0,0001$) (9) a než secukinumab (73,5 % vs. 48,3 %,

Obr. 4. Dlouhodobá účinnost bimekizumabu v léčbě psoriázy v porovnání s komparátory (9, 11, 12)

